SYSAVA RHA KISS®

TEOXANE SA
info@teoxane.com

EN - Instructions for use

Only to be administered by appropriately trained healthcare professionals who are qualified or accredited in accordance with national rules.

Description

TEOSYAL RHA KISS® is a sterile, transparent, non-pyrogenic, viscoelastic gel made of hyaluronic acid (HA) of non-animal origin and of mean molecular weight higher than 1 million Dalton. It is crosslinked with BDDE (1,4-Butanediol diglycidyl ether), and contains 0.3% of lidocaine hydrochloride (Lido) for its anesthetic properties. Each box contains two pre-filled syringes of TEOSYAL RHA KISS®. For each syringe, the label contains two sterile 30G½" needles and two traceability labels (one to be placed in the patient's file and one to be kept by the doctor or the patient medical records). The volume of gel in each syringe is indicated on the crosshead box as well as on each syringe.

Hyaluronic acid is a major constituent of the ground substance of the dermal extracellular matrix. A genuine molecular species, its helicoidal structure enables it to trap up to a thousand times its weight in water. It is widely distributed in connective tissues and hydrates the skin, though its content diminishes with age. As the skin becomes thinner and fragile, initial skin fine fracture lines appear. TEOSYAL RHA KISS® creates a volume that corrects wrinkles, chases depressions and restores skin hydration. It may also add volume to the lips and/or enhance their contour.

TEOSYAL RHA KISS® is a biodegradable product that is progressively resorbed over time. The HA estimated half-life in the skin is 1.5 days (Laurent et al. 1989). The persistence of the treatment is dependent on several factors including the nature of the severity of the wrinkle to be treated, the injection area, the volume injected, the patient's physiology and how the injector will decide if a touch-up session may be required for optimal results.

As their aesthetic indications, TEOSYAL® products do not have an intended medical purpose. Therefore, the non-medical benefit of TEOSYAL® devices is understood as clinical performance. Overall, 70 to 100% of patients experienced an aesthetic improvement of the treated area following the injection, based on data collected throughout clinical studies program.

Composition

Hyaluronic acid.....23 mg/mL
Degree of crosslinking*.....8%
*Measured by Nuclear Magnetic Resonance (NMR) analysis.
Other ingredients:
Lidocaine hydrochloride.....0.3% by mass
Water for injection and phosphate buffer.....q.s. ad 1 mL
BDDE as crosslinking agent.....< 1 ppm

Indications

Aesthetic indications of TEOSYAL RHA KISS®:
TEOSYAL RHA KISS® is indicated for the treatment of the perioral region (lips including philtrum, oral commissures).
Lidocaine hydrochloride is a local anesthetic agent designed to reduce the sensation of pain.

Contraindications

TEOSYAL RHA KISS® must not be used in the case of:
- patients having cutaneous disorders, inflammation or infection at or near to the treatment site. Injection procedures can lead to reactivation of latent or subclinical herpes viral infection,
- patients having a known hypersensitivity to hyaluronic acid with a history of severe allergy or anaphylactic shock,
- patients with autoimmune disease,
- pregnant, breastfeeding women, or patients less than 18 years old.

Because of the presence of lidocaine, TEOSYAL RHA KISS® must not be used in the case of:
- **known hypersensitivity to lidocaine and/or amide local anesthetic agents,**
- patients with cardiac diseases and/or undergoing treatment for heart diseases (beta blockers),
- patients with hepatic insufficiency and/or undergoing treatment for a liver disease,
- patients suffering from epilepsy or porphyria.

Do not use in combination with other aesthetic procedures (such as peeling, laser treatment or other injectable treatment). Do not inject in the most superficial layer of the skin (epidermis), at less than 4 mm depths other than for the indication of "Dosage and method of administration" section. Do not inject into or close to a blood vessel or close to a nerve.

Dosage and method of administration

To minimize the risk of potential complications or unaesthetic results, it is mandatory to respect the following instructions. TEOSYAL® is only by well-trained healthcare professionals experienced with injection techniques and knowledge of the anatomy and histology of the treated area. **It is the responsibility of the healthcare professional, with educational activities, to maintain his/her skills and academy.** Prior to treatment, patients must be questioned regarding their medical history and their current medical conditions or medication that could affect the procedure and should be informed about the procedure, potential complications, contraindications, precautions, and potential side effects. The patient need for pain relief with either local or general anesthetic agent should be assessed. Areas to be treated must be disinfected with a skin disinfectant solution. Due to the risk of interaction, it is recommended that TEOSYAL® fillers do not come into contact with quaternary ammonium salts (such as benzalkonium chloride).

It is important to use a sterile appropriate needle, depending on the injected indications and/or the injection technique. Suitable needles are proposed suppliers' lists. They are not supplied with the syringe in the box. As an alternative to the needle, a blunt cannula may be used (for example, a cannula with cannula TSK 25G/50 mm has been verified). When a cannula is used, an entry point is made in the skin with a needle, of the most appropriate size.

Before the gel is to be treated, TEOSYAL RHA KISS® is injected slowly at variable depths: into the dermis, subcutaneously, or into the subcutis or in the immediate of the red lips. Depending on the corrections to be made and the results sought, one or several injection sessions may prove necessary to obtain an optimal result. This should be determined by the healthcare professional in charge of the treatment. It is recommended to use a maximum volume of 6 mL per session per treatment area. Depending on the area to be treated, corrections are particularly adapted to the indications. A first injection with the smallest volume possible (e.g.: for injection in lips, 2 mL maximum is recommended) is recommended under the sole charge of the treatment will decide on the injection techniques according to the results sought and the volume of gel to be required. Stop the injection well before withdrawing the needle/ cannula from the skin to avoid the product flow back during the treatment site. The treated sites should be carefully massaged to ensure uniform distribution of the product at the corrected areas.

Side effects

The healthcare professional must inform the patient about the potential side effects and the need to report to the medical practice immediately following injection or after a delay. Immediate monitoring of the patient is strongly recommended during 30 minutes after injection, and the healthcare professional must remind the patient to consult a medical professional if side effects do not resolve spontaneously. The healthcare professional should use or prescribe an appropriate treatment in regard to its medical knowledge, patient characteristics and evolution of the symptoms. The most common treatments may include anti-inflammatory drugs, antibiotics, or implant dissolution. Before the treatment, the healthcare professional should be informed about the risk of temporary or non-temporary adverse events described below or known.

The following complications, reported in the clinical literature and/or identified during clinical investigations, are well-known reactions to hyaluronic acid dermal fillers. These include, among others (non-exhaustive list):

- Common treatment reactions (≥1/100) at the injection site, usually mild and self-resolving pain at the point of injection, tenderness, redness, swelling, bruising, hardness, itching, a potential bleeding and/or blister formation, swelling/oedema, firmness/ induration, lumps/bumps (including papules), itching.
- Probable but less common complications (≥1/1,000 and ≤1/100): dyschromia/discolorations, inflammatory reactions (with potential hyperthermia), infection (including localized or generalized infection and abscesses), loss of sensitivity around the injected area or temporary paraesthesia (with potential associated hypoesthesia), erythema, pruritus, allergy/ allergy (including hypersensitivity, dermatitis allergy, urticaria), nodules (possible granulomas), migration of product.
- Albeit not detected through TEOXANE's clinical investigations, rare but serious complications (≤1/1,000) can be also observed in the clinical literature pertaining to HA fillers and identified in the post-marketing experience: Ischemia and necrosis, vascular occlusion, visual disturbances, vascular events, anaphylactic shock, injection in or close to a blood vessel (intravascular injection), alterations around the lips (lip swelling and skin/tissue necrosis). Although extremely rare (about 1/100,000 injections), cases of granulomatous inflammation may also add volume to the lips and/or enhance their contour. TEOSYAL RHA KISS® is a biodegradable product that is progressively resorbed over time. The HA estimated half-life in the skin is 1.5 days (Laurent et al. 1989). The persistence of the treatment is dependent on several factors including the nature of the severity of the wrinkle to be treated, the injection area, the volume injected, the patient's physiology and how the injector will decide if a touch-up session may be required for optimal results.

Precautions

Soft tissue filler injection is a medical procedure which involves an element of risk. Therefore, it must be carried out with care. It must be carried out in a suitable environment and all the aseptic precautions must be taken. The risks and benefits of concerning the possible interactions with other filling implants or filling substances should be considered prior to injection. A professional will assess and decide on further injections with other filling substances only after a delay of at least six months after the previous injection.

Prior to treatment, the healthcare professional must take into account the fact that this filling product contains lidocaine.

Additional precautions include:
- not to take high-doses of vitamin E, aspirin, anti-inflammatories or anticoagulants during the 2 weeks prior the injection session,
- not to use any make-up during the 12 hours following injection,
- not to expose treated areas to aggressive conditions (for any type, extended sun exposure, UV rays, and extreme temperatures) during the first week, sauna, hammam, or for two weeks following the treatment,
- not to undergo any dental extraction occurs (skin whitening and/or dental surgery) during the 2 weeks following the procedure, the injection should be stopped, and all appropriate measures taken.
- Avoid overcorrection.

Sportspeople must be made aware of the fact that this product contains lidocaine which may cause a positive reaction in a drug test.

Precautions for storage and disposal

Store between 2°C and 25°C, away from direct sunlight. Ensure to keep the product out of the reach of children. Do not use packaging and make sure there are no visible signs of damage to the packaging before use. Do not use the device if the product label before use. Do not use after the expiry date, it is the responsibility of the healthcare professional to use the unintentionally opened before use, or if the storage conditions are not respected. Do not resterilize. Do not use if the product syringe shows signs of separation, bubbles and/or appears cloudy. Do not use if the syringe, or the seal of the syringe's tip cap is damaged.

Dispose of all unused gel and waste in accordance with local requirements.

Interactions

Do not use in combination with other aesthetic procedures (such as peeling, laser treatment or other injectable treatment).

Pregnancy and lactation

Soft tissue filler injection is not considered as a routine procedure during pregnancy or lactation. Therefore, the non-medical benefit of TEOSYAL® devices is understood as clinical performance. Overall, 70 to 100% of patients experienced an aesthetic improvement of the treated area following the injection, based on data collected throughout clinical studies program.

Precautions for storage and disposal

Store between 2°C and 25°C, away from direct sunlight. Ensure to keep the product out of the reach of children. Do not use packaging and make sure there are no visible signs of damage to the packaging before use. Do not use the device if the product label before use. Do not use after the expiry date, it is the responsibility of the healthcare professional to use the unintentionally opened before use, or if the storage conditions are not respected. Do not resterilize. Do not use if the product syringe shows signs of separation, bubbles and/or appears cloudy. Do not use if the syringe, or the seal of the syringe's tip cap is damaged.

Dispose of all unused gel and waste in accordance with local requirements.

Interactions

Do not use in combination with other aesthetic procedures (such as peeling, laser treatment or other injectable treatment).

Pregnancy and lactation

Soft tissue filler injection is not considered as a routine procedure during pregnancy or lactation. Therefore, the non-medical benefit of TEOSYAL® devices is understood as clinical performance. Overall, 70 to 100% of patients experienced an aesthetic improvement of the treated area following the injection, based on data collected throughout clinical studies program.

FR - Mode d'emploi

Doit être administré uniquement par des professionnels de santé dûment formés qui sont qualifiés ou accrédités conformément à la législation locale en vigueur.

Description

TEOSYAL RHA KISS® est un gel viscoélastique stérile, transparent, apyrogène, composé d'acide hyaluronique (AH) d'origine non animale et d'un poids moléculaire moyen supérieur à 1 million de Dalton. Il est réticulé avec du 1,4-butanediol diglycidyléther (BDDE) et contient 0,3 % en masse de chlorhydrate de lidocaïne (Lido) pour ses propriétés anesthésiques. Chaque boîte contient deux seringues pré-remplies de TEOSYAL RHA KISS®. Pour chaque seringue, l'étiquette comporte deux aiguilles stériles 30G ½" et deux étiquettes de traçabilité (une à remettre au patient pour son dossier médical et une à conserver dans le dossier médical du patient). Le volume de gel dans chaque seringue est indiqué sur la boîte ainsi que sur chaque seringue.

L'acide hyaluronique est un constituant majeur de la substance fondamentale de la matrice extracellulaire dermique. Espèce moléculaire à part entière, sa structure hélicoïdale lui permet de séquestrer jusqu'à mille fois son poids en eau. Il est largement répandu dans les tissus conjonctifs, il hydrate la peau, bien que sa teneur diminue avec l'âge. Par la suite, à mesure que la peau devient plus fragile, les premières lignes de cassure cutanées apparaissent. TEOSYAL RHA KISS® crée un volume qui corrige les rides, dépressions cutanées et restaure l'hydratation de la peau. Il peut également donner du volume aux lèvres et/ou rehausser leur contour.

TEOSYAL RHA KISS® est un implant biodégradable qui se résorbe progressivement au cours du temps. La durée de vie estimée de TEOSYAL RHA KISS® est comprise entre 12 et 18 mois. La durée du traitement dépend de plusieurs facteurs, dont le type de peau, la sévérité des rides à traiter, la zone d'injection, le volume injecté, la physiologie et le mode de vie du patient. Le médecin injecteur doit décider si une séance de retouche est nécessaire pour obtenir des résultats optimaux.

Dans leurs indications esthétiques, les produits TEOSYAL® n'ont pas de finalité médicale. Ainsi, un volume qui corrige les rides ou une modification du dispositif TEOSYAL® est considéré comme une performance clinique. Dans l'ensemble, 70 à 100 % des patients ont présenté une amélioration esthétique de la zone traitée après l'injection, d'après les données recueillies tout au long du programme d'études cliniques.

Composition

Acide hyaluronique.....23 mg/mL
Degré de réticulation*.....8%
*Mesuré par analyse de la résonance magnétique nucléaire (RMN).
Autres ingrédients :
Chlorhydrate de lidocaïne.....0,3 % en masse
Tampon phosphaté pH 7,3.....q.s.p. 0,7 mL
BDDE comme agent de réticulation.....< 1 ppm

Indications

Indications esthétiques de TEOSYAL RHA KISS® :
TEOSYAL RHA KISS® est indiqué pour le traitement de la région péri-orale (lèvres incluant philtrum, commissures labiales).
Le chlorhydrate de lidocaïne est un agent anesthésique local conçu pour réduire la sensation de douleur.

Contre-indications

TEOSYAL RHA KISS® ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
- chez les patients présentant des troubles cutanés, une inflammation ou une infection au niveau ou à proximité de la zone de traitement. Les injections peuvent réactiver une infection virale herpétique latente ou subclinique,
- chez les patients présentant une hypersensibilité connue à l'acide hyaluronique avec des antécédents d'allergie sévère ou de choc anaphylactique ;
- chez les patients atteints de maladies auto-immunes ;
- chez les femmes enceintes, allaitantes ou patients ayant moins de 18 ans.

En raison de la présence de lidocaïne, TEOSYAL RHA KISS® ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
- **en cas d'hypersensibilité connue à la lidocaïne et/ou aux agents anesthésiques locaux de type amide,**
- chez les patients atteints de maladies cardiaques et/ou sous traitement pour des troubles cardiaques (bêtabloquants),
- chez les patients présentant une insuffisance hépatique et/ou sous traitement pour une maladie hépatique ;
- chez les patients souffant d'épilepsie ou de porphyrie.

Ne pas utiliser en association avec d'autres procédures esthétiques (comme le peeling, le traitement au laser ou le traitement par injection). Ne pas injecter dans la couche la plus superficielle de la peau (épiderme) ni à des profondeurs inférieures à 4 mm, sauf dans le cas de l'indication « Posologie et mode d'administration ». Ne pas injecter dans ou à proximité d'un vaisseau sanguin ou à proximité d'un nerf.

Posologie et mode d'administration

Afin de minimiser les risques de complications potentielles ou de résultats insatisfaisants (dont une asymétrie faciale), le respect des instructions qui suivent est obligatoire. Seul un praticien formé, expérimenté dans les techniques d'injection et possédant une bonne connaissance de l'anatomie et de l'histologie de la zone à traiter, TEOSYAL RHA KISS® est injecté lentement à des profondeurs variables : dans le derme, en sous-cutané ou dans le subcutané ou à proximité immédiate des lèvres rouges. Selon les corrections à apporter et les résultats recherchés, une ou plusieurs séances d'injection pourront s'avérer nécessaires pour obtenir un résultat optimal. Cela doit être déterminé par le professionnel de santé en charge du traitement. Il est recommandé d'utiliser un volume maximum de 6 mL par séance de traitement. Les corrections sont tout particulièrement adaptées aux indications sélectionnées. Il est recommandé d'utiliser un volume initial le plus faible possible (par ex., pour une injection dans les lèvres, 2 mL maximum sont recommandés) et d'augmenter ensuite en fonction de la technique d'injection, de la réponse individuelle du patient et du résultat recherché. Arrêter l'injection bien avant de retirer l'aiguille/la canule de la peau pour éviter le reflux du produit pendant le traitement. Les zones traitées doivent être soigneusement massées pour assurer une distribution uniforme du produit au niveau des zones corrigées.

Effets secondaires

Le professionnel de santé doit informer le patient des effets secondaires potentiels et de la nécessité de se présenter immédiatement après l'injection ou plus tard. Une surveillance immédiate du patient est vivement recommandée pendant 30 minutes suivant l'injection, et le professionnel de santé doit rappeler au patient qu'il doit consulter un médecin si l'un de ses effets secondaires ne disparaissent pas spontanément. Le professionnel de santé doit utiliser ou prescrire un traitement approprié en fonction de ses connaissances médicales, des caractéristiques du patient et de l'évolution des symptômes. Les traitements les plus fréquents sont des anti-inflammatoires, des antibiotiques ou la dissolution de l'implant. Avant le traitement, le professionnel de santé doit informer le patient de signaler tout événement indésirable temporaire ou non temporaire décrit ci-dessous.

Les complications suivantes, rapportées dans la littérature clinique et/ou identifiées au cours des investigations cliniques, sont des réactions bien connues aux implants dermiques à base d'acide hyaluronique bien connues. Il s'agit, entre autres (liste non exhaustive) :

Réactions fréquentes au traitement (≥ 1/100) au niveau de la zone d'injection, généralement légères et d'évolution spontanée résolutives : douleur au point d'injection, sensibilité, rougeur/ érythème, gonflement/œdème, ecchymose, induration/fermeté, formation de cloques, gonflement/œdème, douleur/inconfort, démangeaison, saignement/hémorragie.

Complications probables mais moins fréquentes (≥ 1/1 000 et ≤ 1/100) : dyschromie/décolorations, réactions inflammatoires (avec hyperthermie potentielle), infection (y compris infection localisée ou généralisée et abcès), perte de sensibilité autour de la zone injectée ou paresthésie temporaire (associée à une hypoesthésie potentielle), érythème, prurit, allergie/réaction allergique (y compris hypersensibilité, dermatite allergique, urticaire), nodules (nodules inflammatoires granulomes), migration du produit.

Bien que non détectés par les investigations cliniques de TEOXANE, des complications graves rares (≤ 1/1 000) ont été rapportées dans la littérature clinique relative aux implants de comblement à base d'AH et identifiées dans le cadre de la surveillance post-commercialisation des dispositifs : ischémie et nécrose, troubles visuels, événements vasculaires, choc anaphylactique, injection dans ou à proximité immédiate d'un vaisseau sanguin (injection intravasculaire), altérations autour des lèvres (gonflement des lèvres et nécrose cutanée/tissulaire). Bien qu'extrêmement rares (environ 1/1 000 000), les cas peuvent se traduire par un volume supplémentaire ou une déformation visuelle temporaire ou permanente, ou une inflammation granulomateuse. Le produit est biodégradable et se résorbe progressivement au cours du temps. La durée de vie estimée de TEOSYAL RHA KISS® est comprise entre 12 et 18 mois. La durée du traitement dépend de plusieurs facteurs, dont le type de peau, la sévérité des rides à traiter, la zone d'injection, le volume injecté, la physiologie et le mode de vie du patient. Le médecin injecteur doit décider si une séance de retouche est nécessaire pour obtenir des résultats optimaux.

Dans leurs indications esthétiques, les produits TEOSYAL® n'ont pas de finalité médicale. Ainsi, un volume qui corrige les rides ou une modification du dispositif TEOSYAL® est considéré comme une performance clinique. Dans l'ensemble, 70 à 100 % des patients ont présenté une amélioration esthétique de la zone traitée après l'injection, d'après les données recueillies tout au long du programme d'études cliniques.

Précautions d'emploi

L'injection de produit de comblement dans les tissus mous est une procédure médicale qui comporte un risque. Elle doit donc être réalisée dans un environnement approprié et toutes les précautions habituelles doivent être prises. En raison de l'absence de données cliniques, l'association de TEOSYAL RHA KISS® avec d'autres implants de comblement (implants de comblement à base d'acide hyaluronique ou autres, implants permanents) ou produits de santé évalués et déclarés d'autres injections avec d'autres produits de comblement ou d'implants avant le début ou à la fin de l'injection précédente.

Avant le traitement, le professionnel de santé doit tenir compte du fait que ce produit de comblement contient de la lidocaïne.

Le patient doit être informé :
- de ne pas prendre de fortes doses de vitamine E, d'aspirine, d'anti-inflammatoires ou d'anticoagulants pendant la semaine précédant l'injection,
- de ne pas appliquer de maquillage dans les 12 heures suivant l'injection,
- de limiter les traitements dentaires, les autres actes esthétiques de type tyne, l'exposition prolongée au soleil, les rayons UV/ à des températures extrêmes (saunas, hammams, etc.) pendant la première semaine qui suivent le traitement.
- Le risque d'une réaction croisée potentielle. Éviter/surveiller en cas de prise de médicaments contenant des sels d'ammonium quaternaires (comme le chlorure de benzalkonium).

Les sportifs doivent être informés que ce produit contient de la lidocaïne, ce qui peut entraîner un résultat positif à un test anti-dopage.

Précautions de stockage et d'élimination

À conserver entre 2 °C et 25 °C, à l'abri de la lumière directe du soleil. Veiller à conserver le produit hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser l'emballage et s'assurer que l'emballage ne présente pas de signes visibles de détérioration avant utilisation. Vérifier la date de péremption sur l'étiquette du produit avant utilisation. Ne pas utiliser le produit après la date de péremption, si l'emballage est endommagé, si l'emballage a été involontairement ouvert avant utilisation, ou si les conditions de conservation n'ont pas été respectées. Si le contenu d'une seringue présente des signes de séparation, des bulles et/ou un semble trouble, ne pas utiliser cette seringue. À la fin de la séance de traitement, tout gel inutilisé et tout déchet doivent être utilisé restant. La seringue et les aiguilles sont fournies stériles. Ne pas ouvrir ou endommager l'emballage avant l'usage prévu. Par conséquent, ne pas réutiliser la seringue ni les aiguilles. Ne pas restériliser la seringue ni les aiguilles. Ne pas effectuer de gel peut sécher, ce qui entrave son extrusion à travers l'aiguille/la canule. Ne pas utiliser la seringue si le gel (ou, généralement d'un composé toxique) ou un risque infectieux. Ne pas utiliser la seringue si le capuchon de l'embout de la seringue présente des dommages. Éliminer tout gel inutilisé et tout déchet issu de l'utilisation par des méthodes conformes aux exigences locales.

Une carte d'implant est remise au patient après l'injection. Les informations à fournir au patient concernant le produit injecté sont disponibles sur la notice d'utilisation sur Internet : www.teoxane.com/productinfo.

Le matériel clos contient des équipements de performances physiques (RCSPC) sera disponible sur Eudamed (dès qu'il sera actif), sur le site Internet www.teoxane.com/ eudamed/rcspcnone. La liste des normes harmonisées et des spécifications communes appliquées pour ce produit sera disponible dans le RCSPC. La notice d'utilisation électronique sera disponible sur le site Internet www.teoxane.com/dermal-fillers-dfu. Une notice d'utilisation supplémentaire peut être fournie sur demande.

Montage de l'aiguille/la canule sur la seringue

Pour une utilisation optimale des produits TEOSYAL® PureSense, il est important de bien monter l'aiguille/la canule correctement. Bien à la seringue (voir les étapes ci-dessous décrites dans les figures 1 à 3). Ceci est important pour éviter toute contamination et une obstruction ou une pression pendant l'injection et l'extrusion du gel. Ne pas utiliser l'aiguille/la canule si l'emballage de l'aiguille/la canule est endommagé ou si l'aiguille/la canule avec les mains. Lors de la fixation de l'aiguille/la canule à une seringue, ne pas trop serrer et ne pas exercer de force latérale.

DE – Gebrauchsanweisung

Nur von entsprechend geschulten medizinischen Fachpersonal und qualifiziert oder akkreditiert nach nationalen Rechtsvorschriften qualifiziert oder zugelassen ist.

Beschreibung

TEOSYAL RHA KISS® ist ein gel viscoélastico estéril, transparente y apirógeno elaborado con ácido hialurónico (AH) de origen no animal y con un peso molecular medio superior a 1 millón de daltones. Está reticulado con BDDE (1,4-butanodiol diglicidil éter) y contiene un 0,3 % de clorhidrato de lidocaína (Lido) por sus propiedades anestésicas. Cada caja contiene dos jeringuillas precargadas de TEOSYAL RHA KISS®. Para cada jeringuilla, la caja contiene dos agujas estériles de calibre 30G ½" y dos etiquetas de trazabilidad (una para entregar al paciente y otra para que el médico la conserve en la historia clínica del paciente). El volumen de gel en cada jeringuilla se indica en la caja de cartón, así como en la jeringuilla.

El ácido hialurónico es uno de los componentes principales de la sustancia fundamental de la matriz extracelular dérmica. Al ser una auténtica especie molecular, su estructura helicoidal le permite atrapar hasta mil veces su peso en agua. Está muy extendido en los tejidos conjuntivos, en los que hidrata la piel, aunque su contenido disminuye a medida que la piel se vuelve más frágil y aparecen las primeras líneas de fractura cutánea. TEOSYAL RHA KISS® crea un volumen que corrige las arrugas y las depresiones cutáneas, además de restablecer la hidratación de la piel. También puede aportar volumen a los labios o realzar su contorno.

TEOSYAL RHA KISS® es un implante biodegradable que se reabsorbe de forma progresiva con el tiempo. La vida útil estimada de TEOSYAL RHA KISS® oscila entre 12 y 18 meses. La duración del tratamiento depende de varios factores tales como el tipo de piel, la gravedad de las arrugas tratadas, la zona de inyección, el volumen inyectado o la fisiología y el estilo de vida del paciente. El médico que lleve a cabo la inyección debe decidir si es necesaria una sesión de retoque para obtener resultados óptimos.

Dentro sus indicaciones estéticas, los productos TEOSYAL® no tienen una finalidad médica prevista. Por lo tanto, el beneficio no médico de los dispositivos TEOSYAL® se entiende como funcionamiento clínico. En general, del 70 al 100 % de los pacientes experimentaron una mejora estética de la zona tratada después de la inyección, según los datos recopilados a lo largo del programa de estudios clínicos.

Composición

Ácido hialurónico.....23 mg/mL
Grado de reticulación*.....8%
*Método por análisis de resonancia magnética nuclear (RMN).
Otros ingredientes:
Clorhidrato de lidocaína.....0,3 % en masa
Agua para inyectables y tampón fosfato c.s.p. 1 mL
BDDE como agente de reticulación.....< 1 ppm

Indicaciones

Indicaciones estéticas de TEOSYAL RHA KISS®:
TEOSYAL RHA KISS® está indicado para el tratamiento de la región perioral (labios, incluidos el filtrum, comisuras orales).
El clorhidrato de lidocaína es un anestésico local diseñado para reducir la sensación de dolor.

Contraindicaciones

TEOSYAL RHA KISS® no debe utilizarse en los siguientes casos:
- Pacientes con afecciones cutáneas, inflamación o infección en o cerca del tratamiento. Los procedimientos de inyección pueden reactivar una infección herpesviral latente o subclínica.
- Pacientes con hipersensibilidad conocida al ácido hialurónico, con antecedentes de alergia grave o choque anafiláctico.
- Pacientes con enfermedades autoinmunes.
- Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, o pacientes menores de 18 años.

Debido a la presencia de lidocaína, TEOSYAL RHA KISS® no debe utilizarse en los siguientes casos:
- **Hipersensibilidad conocida a la lidocaína o a los anestésicos locales de tipo amídico.**
- Pacientes con cardiopatías o en tratamiento de cardiopatías (betabloqueantes).
- Pacientes con insuficiencia hepatocelular o en tratamiento de hepatopatías.
- Pacientes epilépticos o con porfiria.

No usar en combinación con otros intervenciones estéticas (como exfoliación, tratamiento con láser u otro tipo de inyectables). No inyectar en la capa más superficial de la piel (epidermis) ni a profundidades distintas a las descritas en la sección "Posología y método de administración". No inyectar en vasos sanguíneos ni cerca de estos, ni cerca de nervios.

Posología y método de administración

Para minimizar el riesgo de posibles complicaciones o resultados insatisfactorios (incluida la asimetría facial), el producto TEOSYAL® debe ser administrado únicamente por profesionales capacitados, con experiencia en técnicas de inyección y con conocimientos sobre la anatomía y la histología de la zona a inyectar. **Es responsabilidad del profesional de salud responsable del tratamiento, con actividades educativas, mantener sus habilidades y conocimientos actualizados.** Antes del tratamiento, es preciso interrogar a los pacientes sobre sus antecedentes médicos y su estado de salud actual, así como sobre cualquier medicación que pueda afectar al procedimiento, y deben ser informados sobre el procedimiento, las posibles complicaciones, las contraindicaciones, las precauciones y los posibles efectos secundarios. Se debe evaluar la necesidad de alivio del dolor mediante anestésicos locales o generales. Las áreas a tratar deben desinfectarse con una solución antiséptica adecuada. Debido al riesgo de interacción, se recomienda no entrar en contacto con sales de amonio cuaternario (como el cloruro de benzalconio).

Es importante utilizar una aguja estéril adecuada a las indicaciones de inyección y/o a la técnica de inyección. Las agujas adecuadas (de los proveedores aprobados TSK o Terumo) no se suministran con la jeringuilla en la caja. Como alternativa a la aguja, también se puede usar una cánula roma de calibre 25G (se ha comprobado la seguridad y eficacia de la cánula TSK 25G/50 mm). Si se utiliza una cánula, se creará un punto de entrada en la piel con una aguja de tamaño adecuado.

Antes de tratar el gel, inyecte TEOSYAL RHA KISS® se inyecta lentamente a profundidades variables: en dermis, por vía subcutánea, o en hipodermis y subcutánea justo debajo de los labios rojos. Según las correcciones a aportar y los resultados que se deseen obtener, el profesional de salud responsable del tratamiento puede considerar una o varias sesiones de inyección. Se recomienda no administrar más de 6 mL por sesión de tratamiento. Las correcciones son especialmente adecuadas para las indicaciones seleccionadas. Se recomienda utilizar un volumen inicial lo más bajo posible (por ejemplo, para inyección en los labios, se recomiendan 2 mL como máximo) y, a continuación, el profesional de salud responsable del tratamiento decidirá la técnica de inyección, de acuerdo con los resultados que se deseen obtener y la cantidad de producto necesaria. Antes de retirar la aguja/cánula de la piel para evitar que el producto refluya durante el tratamiento, retire la inyección mucho antes de retirar la aguja/cánula de la piel para evitar que el producto refluya durante el tratamiento. Los lugares tratados deben masajearse cuidadosamente para garantizar una distribución uniforme del producto en los lugares sometidos a corrección.

Efectos secundarios

El profesional de la salud debe informar al paciente sobre los posibles efectos secundarios y la necesidad de acudir a consulta inmediatamente después de la inyección o pasado un tiempo. Se recomienda encarecidamente la supervisión inmediata del paciente durante 30 minutos posteriores a la inyección, y el profesional de la salud debe recordarle al paciente que consulte a un profesional sanitario si los efectos secundarios no se resuelven de forma espontánea. El profesional de la salud debe utilizar o prescribir un tratamiento adecuado según sus conocimientos médicos, las características del paciente y la evolución de los síntomas. Los tratamientos más comunes pueden incluir fármacos antiinflamatorios, antibióticos o la disolución del implante. Antes del tratamiento, el profesional de salud debe indicar al paciente que notifique cualquier acontecimiento adverso temporal o permanente descrito a continuación o conocido.

Las complicaciones siguientes, notificadas en la bibliografía clínica y/o identificadas durante las investigaciones clínicas, son reacciones bien conocidas a los rellenos dérmicos de ácido hialurónico. Dicho acontecimientos incluyen, entre otros (lista no exhaustiva):

Reacciones frecuentes al tratamiento (≥1/100) en el lugar de inyección, generalmente leves y de resolución espontánea: dolor en el punto de inyección, sensibilidad, enrojecimiento/eritema, hinchazón/edema, hematoma, formación de ampollas, hinchazón/edema, dureza/endurecimiento, bultos/protuberancias (incluidas pápulas), picor.

Complicaciones probables, pero menos frecuentes (≥1/1000 y ≤1/100): dispigmentación/decoloración, reacciones inflamatorias (con posible hipertermia), infección (incluidos infecciones y abscesos localizados o generalizados), pérdida de sensibilidad alrededor de la zona inyectada o parestesia temporal (con posible hipoestesia asociada), eritema, prurito, alergia/reacción alérgica (incluida hipersensibilidad, dermatitis alérgica y urticaria), nódulos (posibles granulomas), migración del producto.

Aunque no se han detectado en las investigaciones clínicas de TEOXANE, en la bibliografía clínica relativa a rellenos infiltrantes, pero graves (≤1/1000), en la bibliografía clínica relativa a los rellenos de ácido hialurónico y detectadas en el seguimiento poscomercialización de los rellenos TEOSYAL®: necrosis de tejidos/piel, alteraciones visuales, vasculares o choque anafiláctico, inyección en o cerca de un vaso sanguíneo (una puede provocar embolia), alteraciones alrededor de los labios (hinchazón y necrosis cutánea/tisular. Aunque es extremadamente infrecuente (aproximadamente 1/1 000 000), los casos más graves de oclusión vascular pueden provocar un deterioro temporal o permanente de la visión, un accidente cerebrovascular que puede dar lugar a un accidente cerebrovascular o la muerte.

El riesgo de embolización, oclusión vascular, isquemia y necrosis cutánea/tisular es mayor cuando se inyecta en la zona glabelar o nasogeniana cerebral o accidente cerebrovascular o la muerte. Se recomienda precaución en la glabela.

Otras reacciones no graves notificadas a Teoxane (en tasas inferiores a 1/1000) son el empeoramiento temporal de la apariencia de la zona tratada después de la inyección, según los datos recopilados a lo largo del programa de estudios clínicos.

Composición

Ácido hialurónico.....23 mg/mL
Grado de reticulación*.....8%
*Método por análisis de resonancia magnética nuclear (RMN).
Otros ingredientes:
Clorhidrato de lidocaína.....0,3 % en masa
Agua para inyectables y tampón fosfato c.s.p. 1 mL
BDDE como agente reticulante.....< 1 ppm

Indicaciones

Indicaciones estéticas de TEOSYAL RHA KISS®:
TEOSYAL RHA KISS® está indicado para el tratamiento de la región perioral (labios, incluido el filtrum, comisuras orales).
El clorhidrato de lidocaína es un agente anestésico local diseñado para reducir la sensación de dolor.

Contraindicaciones

TEOSYAL RHA KISS® no debe utilizarse en los siguientes casos:
- pacientes con disturbios cutáneos, inflamación o infección no en el lugar del tratamiento o cerca de este. Los procedimientos de inyección pueden llevar a reactivación de infección viral latente o no aparente,
- pacientes con hipersensibilidad conocida al ácido hialurónico, con antecedentes de alergia grave o choque anafiláctico,
- pacientes con enfermedades autoinmunes,
- mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, o pacientes menores de 18 años.

Debido a la presencia de lidocaína, TEOSYAL RHA KISS® no debe utilizarse en los siguientes casos:
- **hipersensibilidad conocida a la lidocaína o a los anestésicos locales de tipo amídico.**
- pacientes con cardiopatías o en tratamiento de cardiopatías (betabloqueantes),
- pacientes con insuficiencia hepatocelular o en tratamiento de hepatopatías,
- pacientes con epilepsia o con porfiria.

No usar en combinación con otros intervenciones estéticas (como exfoliación, tratamiento con láser u otro tipo de inyectables). No inyectar en la capa más superficial de la piel (epidermis) ni a profundidades distintas a las descritas en la sección "Posología y método de administración". No inyectar en vasos sanguíneos ni cerca de estos, ni cerca de nervios.

Posología y método de administración

Para minimizar el riesgo de posibles complicaciones o resultados insatisfactorios (incluida la asimetría facial), el producto TEOSYAL® debe ser administrado únicamente por profesionales capacitados, con experiencia en técnicas de inyección y con conocimientos sobre la anatomía y la histología de la zona a inyectar. **Es responsabilidad del profesional de salud responsable del tratamiento, con actividades educativas, mantener sus habilidades y conocimientos actualizados.** Antes del tratamiento, es preciso interrogar a los pacientes sobre sus antecedentes médicos y su estado de salud actual, así como sobre cualquier medicación que pueda afectar al procedimiento, y deben ser informados sobre el procedimiento, las posibles complicaciones, las contraindicaciones, las precauciones y los posibles efectos secundarios. Se debe evaluar la necesidad de alivio del dolor mediante anestésicos locales o generales. Las áreas a tratar deben desinfectarse con una solución antiséptica adecuada. Debido al riesgo de interacción, se recomienda no entrar en contacto con sales de amonio cuaternario (como cloruro de benzalconio).

Es importante utilizar una aguja estéril adecuada a las indicaciones de inyección y/o a la técnica de inyección. Las agujas adecuadas (de los proveedores aprobados TSK o Terumo) no se suministran con la jeringuilla en la caja. Como alternativa a la aguja, también se puede usar una cánula roma de calibre 25G (se ha verificado a compatibilidad con a cánula TSK de calibre 25G/50 mm). Cuando se utiliza una cánula, se creará un punto de entrada na pele com uma agulha afiada de tamanho adequado.

Dependendo da área a tratar, o TEOSYAL RHA KISS® é injetado lentamente a profundidades variáveis: na derme, por via subcutânea, ou na hipoderme ou submucosa do lábio imediatamente abaixo dos lábios vermelhos. Dependendo das correções pretendidas, pode

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Injecteer niet filler voor welke delen is een medische procedure die een inbreuk op uw integriteit van de huid of slijmvlies zoals elke procedure van dit type. Het moet in een geschikte omgeving worden uitgevoerd en alle gebruikelijke voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen. Vanwege het ontbreken van gegevens over de mogelijke interacties met andere vullingmaterialen (HA-vullingmaterialen of andere, mogelijk permanente implantaten), zal de zorgverlener worden injecten met andere vullingmaterialen beoordelen en hierover beslissen afhankelijk van de aard en het type van de vorige injectie.

Voorafgaand aan de behandeling moet de zorgverlener de overeenging nemen dat dit vulproduct blootgesteld is geweest.

De patiënt moet worden geïnformeerd:

- geen hoge dosis vitamine C, aspirine, ontstekingsremmers of antistollingsmiddelen in te nemen in de week voorafgaand aan de injectiesessie;
- geen make-up te gebruiken tijdens de 12 uur na de injectie;
- om bandwerkkleding, behandelingen, zonnebaden, sauna's, procedures van welk type dan ook, langdurige blootstelling aan de zon, uv-straling en extreme temperaturen gedurende 48 uur, inclusief het dragen van petten of vermijden gedurende de twee weken na de behandeling.

Het is de taak van de zorgverlener de procedure bekend van mogelijke ontdoctische opmerken (wet worden of marmeren van de huid, jeuk, pijnlijkheid, erez), moet die zorgverlener onmiddelijk gestopt en meteen alle noodzakelijke maatregelen worden getroffen.

Vermijd overexercise.

Sporters moeten weten dat de hoogte worden gebracht van het feit dat dit product lokaliese bevat, wat een positieve reactie kan veroorzaken in doping-controles.

Voorzorgsmaatregelen voor opslag en verwijdering

Bewaren tussen 2 °C en 25 °C, uit de buurt van direct zonlicht. Bewaar het product in een opslagruimte met verpakking niet verwarmen en controleer vóór gebruik of de geen zichtbare hinderen. Het beschadigde product niet gebruiken. Controleer vóór gebruik de uiterste gebruiksdatum op het productetiket. Niet gebruiken na de uiterste houdbaarheidsdatum. Als de verpakking beschadigd is, als de verpakking ontbroken of geopend is of wanneer de vulling of de verzegeling niet intact is (ingeklemd). Als de inhoud van een spuit tekenen van schifting of een andere verandering heeft tijd, gebruik deze spuit dan niet. Aan het einde van de behandelingscurse is het essentieel dat de lege spuiten en naalden worden verwijderd. Ze mogen niet in de vuilnis of in de vuilnis worden gegooid. Lege spuiten en naalden zijn voor hergebruik en zijn uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik. Gebruik de spuit en de naalden daarom niet opnieuw. Let om te voorkomen dat de gel verwijderbaar (de gel kan uitdrogen, waardoor het product minder van de gel zou de naald kan beklemmen), dat de gel anders reageert (bijvoorbeeld door een toxische verharding of verwijderen), of dat er bacteriën kunnen ontstaat. Gooi gebruikte naalden/canules met hun beschermhuls in de daarvoor bestemde containers om het risico op prikaccidenten en/of infectie te vermijden.

Na de injectie moet een ingreepkaart aan de patiënt worden gegeven. Informatie die aan de patiënt moet worden verstrekt voor herstelling tot het gebruikelijke medische hulpmiddel is beschikbaar op deze website: www.teoxane.com/product/filler.

De samenwatting van de veiligheids- en klinische prestaties (Summary of Safety and Clinical Performance, SSCP) zal beschikbaar zijn op Eudamed (zodra deze actief is) op de volgende website: https://ec.europa.eu/tools/eudamed. Gelieve de lijst met geharmoniseerde normen en gemeenschappelijke specificaties die voor het toepassing zijn op het product te opgenomen in de SSCP. De eIFU (elektronische gebruiksaanwijzing) is beschikbaar op de volgende website: www.teoxane.com/dermal-fillers-ifus. Een aanvullende gebruiksaanwijzing kan op verzoek gratis worden verstrekt.

De naald/canule op de spuit monteren

Voor een optimale gebruik van TEOSYAL® PureSense-producten is het belangrijk dat de naald/canule correct aan de spuit wordt bevestigd (zie de onderstaande stappen, beschreven in diagram 1 t/m 5). Stop niet injecteren en verwang de naald/canule als er tijdens de injectie moeilijkheden of dikte voelt. Gebruik het product onmiddelijk na het openen van de verpakking. Raak de naald/canule niet aan. Gebruik de naald/canule niet als deze beveiligen van de naald/canule voor het opstuit mag u hem niet in stuk aanbrengen en geen lokmale kracht uitoefenen.

HR - Upute za uporabu

Isključivo smije primijeniti zdravstveni djelatnici s odgovarajućom obukom koji su kvalificirani iš određenim zakonom o zakladu o naknadama zakonom.

Opis

TEOSYAL RHA KISS® sterilan je proziran, nepirogen, viskoelastičan gel koji se sastoji od hijaluronske kiseline nedovršivoga podrijetla i prepoznate molekularne mase veze od 1 milijuna daltona. Gel se nalazi u BDDE-om (1,4-butandiol diglicidil etherom) i sadržava 0,3 % masenog udjela lidokain hidroklorida drug regionalni anestetik vrijednosti. Svaka kutija sadržava dvije napunjene štrcaljke proizvoda TEOSYAL RHA KISS® Za svaku štrcaljku kapacitet sadržaja dvije sterilne igle 30G ½" i dvije najbrojnice za sljedivost (jedno treba dati pacijentu, a drugu treba sačuvati liječniku u medicinskoj dokumentaciji pacijenta). Volumen gela u svakoj štrcaljki naveden je na kartonskoj kutiji kao i na svakoj štrcaljki.

Hijaluronska kiselina glavni je sastojak osnovne tvari dermalnog izvanstaničnog matriksa. Prava molekularna struktura ključna je za njezina biološka svojstva. Ovisno o molekularnoj masi, njezina molekularna struktura omogućuje da zadrži do stotinu puta svoju težinu u vodi. Snažna je i elastična. Kako se starimo, količina hijaluronske kiseline u našem tijelu smanjuje se s godinama. Kako kaže pontije: Sve je u hijaluronskoj kiselini: ne prvi dio TEOSYAL RHA KISS® stvara volumen kojim se sprečuje bore, udubljenja ili nedostatak volumena. Drugi dio TEOSYAL RHA KISS® koristiti za dodavanje volumena usnama vilu za poboljšanje njihova oblika.

TEOSYAL RHA KISS® biodegradirati je implantat koji se s vremenom razgrađuje prirodnim enzimima. Proizvod je veliki u proizvoda TEOSYAL RHA KISS® između 12 i 18 mjeseci. Trajanje tretmana ovisi o mnogim čimbenicima, uključujući broj tretmana, količini ili vrsti tretiranog područja, područje ubrizgavanja, dubini ubrizgavanja, fizičkoj aktivnosti pacijenta i individualnom metabolizmu. Ovisno o tim čimbenicima, učinci proizvoda mogu se razlikovati od pacijenta do pacijenta.

Mjere opreza prilikom uporabe

Ne koristiti ako je ambalaža oštećena.

Ne koristiti ako je sterilnost bilo kojeg dijela ugrožena.

Ne koristiti ako je rok uporabe prijavili na adresu medicalsafety@teoxane.com ili obratite zdravstvenom tijelu u zemlji u kojoj se korisnik i/ili pacijent nalaze.

Mjere opreza prilikom uporabe

Ne koristiti ako je ambalaža oštećena.

Ne koristiti ako je sterilnost bilo kojeg dijela ugrožena.

Ne koristiti ako je rok uporabe istekao.

Ako se pojavi ozbiljan nuspojavu, prijavite ga na adresu medicalsafety@teoxane.com ili obratite se nadležnom tijelu u državi članici u kojoj se nalaze korisnik i/ili pacijent.

Odmrzanje i nakon dana

Za zmanjanje tveganja za moteniste zaplete ali nezadovoljive rezultate, proizvod se mora pripremiti i primijeniti u skladu s uputama. Ako se proizvod ne upotrebljava u skladu s uputama, može se pojaviti nedostatak učinkovitosti ili neželjeni učinci. Zdravstveni djelatnici trebali bi biti upoznati s anatomijom područja koje se tretira, kao i s mogućim komplikacijama i neželjenim učincima povezanima s postupkom ubrizgavanja. Prije tretmana, zdravstveni djelatnik mora uzeti u obzir čimbenike koji bi mogli utjecati na ishod postupka, kao što su sadržaj štrcaljke i/ili pacijentova anatomija. Pacijenta treba savjetovati dječeće:

- da prijavi svaku alergiju na lidokain, E. aspirina, protuupalnih lijekova ili antikoagulansa prije tretmana (2 dana prije tretmana);
- da ne uzima dodatke prehrani (2 dana prije tretmana);
- da izbjegava izlaganje suncu, UV zrake i elektromagnetska polja (2 dana prije tretmana);
- da izbjegava fizičku aktivnost, sauna, sunčanje i kupanje (2 dana prije tretmana);
- da izbjegava pušenje (2 dana prije tretmana).

Mjere opreza pri skladištenju i odlaganju

Čuvati na temperaturi od 2 °C do 25 °C, podalje od izravne sunčeve svjetlosti. Pobrinite se da proizvod drže u skladištu u kojem se ne mrzne ambalaža i uvjerite se da nema vidljivih znakova oštećenja na ambalaži prije uporabe. Prije uporabe provjerite rok valjanosti na naljepnici proizvoda. Nemojte koristiti ako je rok uporabe istekao. Nemojte koristiti ako je ambalaža oštećena, ako je ambalaža otvorena, ako je ambalaža otvorena, ako je ambalaža nemaštjenu otvorena prije uporabe ili ako se nisu potpuno uspjeli sladištenja. U slučaju da su u sadržaju štrcaljke vidljivi znakovi razdvajanja, mijehuviti ili ugljeni zamućenja, nemojte upotrijebiti tu štrcaljku. Na kraju svoje tretmana bitno je baciti sav prostali neiskorišteni proizvod. Štrcaljke i igle isporučuju se sterilne i nisu namijenjene za ponovnu sterilizaciju te su namijenjene samo za jednokratnu uporabu. Ponovna uporaba može uzrokovati rizik od infekcije. Nakon što je štrcaljki kvarenje gela čime se smanjuje njegova učinkovitost (gel se može osušiti, čime se ometa njegov protezak iz igle), nepropisno ponašanje gela (npr. stvaranje tekućinog sloja) ili ispitivanje gela (npr. stvaranje tekućinog sloja) ili ispitivanje gela (npr. stvaranje tekućinog sloja) ili ispitiv